

IDENTIFIEZ VOS PLEUROTÉS

Par Fernand Miron, biologiste
Septembre 2020

LES PLEUROTÉS, LEURS HABITATS

Espèces	Pleurote des neiges (peupliers)	Pleurote en huître	Pleurote pulmonaire	Pleurote tardif
Saison principale	Printemps, en juin.	Mai à novembre, jours frais.	Été, en juillet et août, jours chauds	Automne, fin septembre, octobre.
Habitat	Principalement sur les peupliers.	Feuillus à bois dur.	Feuillus à bois dur ou mou.	Feuillus à bois dur.
				
				

Sur le terrain, il est difficile de différencier le pleurote en huître du pleurote pulmonaire, car les saisons se chevauchent et les fructifications sont souvent semblables. Ce sont des critères microscopiques qui permettent de confirmer leur identification.

LES PLEUROTÉS, LEURS CHAPEAUX

Espèces	Pleurote des neiges (peupliers)	Pleurote en huître	Pleurote pulmonaire	Pleurote tardif
Chapeaux	Blancs, parfois beige pâle.	Blancs, parfois grisâtres pâles.	Blanchâtres, beige rosé avec l'âge.	Verdâtres, de gris pâle à foncé, à bleuâtre.
				
				

Seul le pleurote tardif a un chapeau réellement coloré.

LES PLEUROTÉS, MARGE DES CHAPEAUX

Espèces	Pleurote des neiges (peupliers)	Pleurote en huître	Pleurote pulmonaire	Pleurote tardif
Marge du chapeau	Retournée vers le bas au début, étalée par la suite.	Étalée, mince.	Droite, sinueuse à ondulée.	Enroulée au début, étalée par la suite.
				
				

LES PLEUROTÉS, LEURS LAMES

Espèces	Pleurote des neiges (peupliers)	Pleurote en huître	Pleurote pulmonaire	Pleurote tardif
Lames	Blanches de diverses longueurs.	Blanches de diverses longueurs.	Blanches, de diverses longueurs.	Blanches brunissant par la suite; serrées.
Photos				
Photos				

Souvent les lames du pleurote tardif se divisent avant d'arriver à la marge.

LES PLEUROTÉS, LEURS PIEDS

Espèces	Pleurote des neiges (peupliers)	Pleurote en huître	Pleurote pulmonaire	Pleurote tardif
Pied	Attache latérale, pied absent.	Absent ou ± court, pubescent à la base.	Présent, ± long, hirsute à pubescent à la base	Pseudopied de couleur brunâtre.
				
				

© Fernand Miron
Fondation Miron-Royer Inc.

Le pied des pleurotes en huître et pulmonaire sont latéraux ou décentrés, ou parfois centraux s'ils fructifient sur le dessus d'un tronc au sol. Il en est de même pour le pleurote des neiges.

LES PLEUROTÉS, LEUR CHAIR

Espèces	Pleurote des neiges (peupliers)	Pleurote en huître	Pleurote pulmonaire	Pleurote tardif
Chair	Blanche, mince, plus épaisse à la base.	Blanche, mince, plus épaisse dans le pied.	Blanche, mince, plus épaisse dans le pied.	Blanche, épaisse.
				
				

Il existe d'autres espèces de pleurotes au Québec et dans l'est du Canada, mais ce sont les quatre qui se ressemblent et qu'on peut qualifier comme faisant partie du groupe des pleurotes en forme d'huître.

LES PLEUROTÉS, TABLEAU COMPARATIF

ESPÈCES	Pl. des neiges (des peupliers) <i>Pl. populinus</i>	Pleurote en huître <i>Pl. ostreatus</i>	Pleurote pulmonaire <i>Pl. pulmonarius</i>	Pleurote tardif <i>P. serotinus</i>
SAISONS	Printemps, en juin.	Mai à novembre, jours frais.	Été, en juillet et août, jours chauds	Automne, fin sep- tembre, octobre.
HABITATS	Peupliers.	Feuillus à bois dur.	Feuillus à bois dur ou mou.	Feuillus à bois dur.
				
CHAPEAU	Blanc à beige pale.	Blanc à gris pale.	Blanc, beige rosé avec l'âge.	Coloré.
				
LAMES	Blanches.	Blanches.	Blanches.	Coloration pale.
				
PIEDS	Absent.	Présent.	Présent.	Pseudopied.
				
CHAIR	Blanche, mince.	Blanche, mince.	Blanche, mince.	Blanche, épaisse.
				

